

## **BETEGTÁJÉKOZTATÓ Hüvelyi méheltávolítás**

Ezt a műtéti eljárást a leggyakrabban a méh előesése, gyógyszeres kezeléssel meg nem szüntethető méhvérzés, ritkább esetben a méhnyak rosszindulatú daganata- kisebb petefészek tömlők- (ha az anatómiai helyzet kedvező, tág hüvely, könnyen mozgatható méh, laza kötőszövetek, könnyű feltárás) eseteiben alkalmazzuk.

A hüvelyi méheltávolítást az esetek többségében az ún. gerincvelői érzéstelenítésben végezzük, kisebb százalékban intubált gépi lélegeztetéssel, altatásban.

A betegek nagy része idős, többször szült és nagyfokú kötőszöveti gyengeséggel is rendelkezik.

A hüvelyi méheltávolítás sokkal kisebb traumát jelent a betegnek a fájdalom és a műtét utáni lábadozás szempontjából.

A műtét menete a következő:

A hüvely és környéke fertőtlenítését követően a méhnyakon körkörös gallérmetszést végzünk, majd ezen a nyíláson keresztül fokozatosan lekötve a méhet ellátó ereket (vénákat és artériákat) kifejtjük a méhet a függelékeivel (petefészek, petevezeték) együtt, - leválasztva a méhet tartó függesztő szalagokról. Ezután a függesztő szalagokat összekötjük, majd kétoldalt kiöltjük ezáltal felhúzza a hüvelyconkot, amelyet felszívódó fonállal összevarrunk, illetve kis nyílást hagyva a gézdrainnak, amely a műtéti területből a váladék elvezetését biztosítja. A hólyagba katétert rögzítünk, mely biztosítja a vizelet elvezetését. Mind a gézdraint, mind a katétert a műtétet követő 3. napon eltávolítjuk.

A hüvelyi méheltávolítás előnye:

Nem kell a hasfalat a hasüreg felé megnyitni.

Kevesebb fájdalom.

Gyorsabb felépülés.

A hüvelyi méheltávolítás hátránya:

Kis behatolási műtéti nyílás miatt nem látható akkora műtéti terület, mint a hasi műveleteknél, így erősebb vérzés esetén nehezebb a vérzés csillapítása.

A magasan elhelyezkedő, fixált függelékeket (petefészek, petevezeték) nem minden esetben tudjuk eltávolítani, (környező szervek sérülése és vérzésének veszélye nagy) így azokat konzerváljuk.

A hüvelyi méheltávolítás leggyakoribb szövődménye:

Utóvérzés, vérömleny keletkezése, környező szervek húgyhólyag, belek, húgyvezetők sérülése, sebfertőzés, bélműködés megindulásának zavara, illetve nagyon hirtelen és erősen fellépő csillapíthatatlan vérzés esetén a műtétet hasi műtéttel fejezzük be. (lásd. a hasi méheltávolítás leírását)

## **Műtéti beleegyező nyilatkozat**

Alulírott .....(név, születési idő)

tanúsítom, hogy engem dr..... kellő mértékben felvilágosított betegségemről, amely kórisme szerint ..... és a javasolt gyógmódról, valamint a műtéti eljárás kockázatairól és a helyette alkalmazható gyógmódokról is.

Ismertette az ajánlott és más szóba jövő kezelési eljárás előnyeit, ill. hátrányait is.

Felvilágosított arról, hogy folyamatosan kész engem állapotomról, ill. annak változásairól megfelelően tájékoztatni.

Tudomásul veszem, hogy szakszerű kezelés esetén is előfordulhatnak az alábbiakban részletesen felsorolt, előre nem várható szövődmények, melyek a várható gyógyeredményt és gyógtartamot kedvezőtlenül befolyásolják.

Tudomásul veszem, hogy jogom van a felajánlott kezelése bármelyikének vagy mindegyikének elutasítására. A visszautasítás kapcsán bekövetkező szövődményekért, ill. a gyógyeredmény alakulásáért azokat az orvosokat, akiknek a kezelését nem fogadtam el, a felelősség alól felmentem.

Beleegyezésemet a tájékoztatás megértése és a hátlapon található leírás megértése alapján minden kényszertől mentesen adom. Ennek alapján kérem, hogy rajtam ..... műtétet elvégezzék.

Aláírással megerősítve kinyilvánítom, hogy a szóbeli és írásbeli tájékoztatást megértettem és a további felvilágosítás igényével nem kívánok élni.