



MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA  
DÉL-DUNÁNTÚLI TERÜLETI  
SZERVEZETE  
KONGRESSZUSA ÉS TOVÁBBKÉPZŐ  
TANFOLYAMA



Mohács  
2017. szeptember 15-16.

Nestlé  
**BEBA**  
Szakértő gondoskodás  
a gyermekek jövőjéről



Hypoallergén tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, születéstől kezdve

Bruttó fogyasztói ár\*: 2 936 Ft

TB támogatás összege (25%)\*: 734 Ft

Térítési díj\*: 2 202 Ft



Hypoallergén tejalapú anyatej-helyettesítő tápszer, születéstől kezdve

Bruttó fogyasztói ár\*: 2 709 Ft

TB támogatás összege (25%)\*: 677 Ft

Térítési díj\*: 2 032 Ft



Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére, másnak át nem adható.  
Orvosi ellenőrzés mellett alkalmazható. Egészséges csecsemők kizárólagos táplálására is alkalmas születéstől kezdve. A hypoallergén tápszer nem alkalmazható már kialakult tejfehérje allergia esetén. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg. Ne térjen el a használati utasítástól.  
\*OEP végleges publikus gyógyszerforgalmazási (PUPHA) érvényesség kezdete 2017. április 1.  
\*\*50 éves kutatómunka eredményeképpen egyedülálló fehérjetekológiával rendelkezünk.  
**Fontos figyelmeztetés:** A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej.  
A legegészségesebb táplálási mód a szoptatás.

BEBA\_H\_201704/5  
Nestlé Hungária Kft. 2017. április

**NUTRICIA**  
Early Life Nutrition



Hidrolizált fehérjét tartalmazó, tejalapú, anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő tápszerek.



A **Milumil hidrolizált tápszerek** jótékony hatással vannak az immunrendszerre és elősegítik az orális tolerancia kialakulását.\*

**BIZONYÍTOTT HATÁS\***

\* Boyle RJ, Tang ML-K, Chiang WC, Chus MC, Ismail I, Nauta A, Hourihane JO'B, Smith P, Cold M, Ziegler J, Peake J, Quinn P, Rao R, Brown N, Rijntse A, Garssen J, Warner JO On behalf of the PATCH study investigators. Prebiotic-supplemented partially hydrolysed cow's milk formula for the prevention of eczema in high-risk infants: a randomized controlled trial. Allergy 2016; 71: 701-710.  
Milumil HA Start optima 600g és Milumil HA1 optima 600g bruttó fogyára: 3049 Ft, normatív támogatás (25%): 762 Ft, térítési díj: 2287 Ft  
Milumil HA2 optima 600g bruttó fogyára: 3174 Ft, normatív támogatás (25%): 794 Ft, térítési díj: 2380 Ft.  
OEP végleges publikus gyógyszerforgalmazási (PUPHA) érvényesség kezdete: 2017. augusztus 1.  
Tájékoztató kizárólag egészségügyi szakemberek részére, másnak át nem adható. A Nutril Kft. kizárja a felelősségét az egészségügyi szakembereknek szóló szakmai tájékoztató anyag illetéktelen személyek általi felhasználásáért. Jelen kiadvány elválaszthatatlan részét képezi a címkeszöveg és a hivatkozott irodalom.  
Fontos figyelmeztetés! A csecsemő legjobb tápláléka az anyatej. A szoptatás a legegészségesebb táplálási mód. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej vagy a szoptatásnak más akadálya van, tápszer kizárólag a gyermekorvos javaslatára, orvosi ellenőrzés mellett, a használati utasítás szerint alkalmazható. Alkalmazás, ajánlása, illetve rendelése előtt olvassa el a termék címkéin feltüntetett adhatósági és elkészítési útmutatót! Ne térjen el a használati utasítástól, mert az zavart okozhat a kisbaba fejlődésében.  
Anyatej-helyettesítő tápszer - Az anyatej a legjobb a csecsemő számára, 6 hónapos korig a kizárólagos szoptatás a legideálisabb táplálási mód. Az anyatej-kiegészítő tápszer vegyes táplálékkal kiegészítve adható, nem alkalmas 6 hónapos kor előtt az anyatej helyettesítésére. A hozzátáplálás megkezdését csak orvosi, táplálkozástudományi vagy gyógyszerészeti szakemberek tanácsára ajánlott megkezdni, a csecsemő egyedi növekedési és fejlődési igényeit figyelembe véve. Amennyiben nem áll rendelkezésre elegendő anyatej, vagy a szoptatásnak más akadálya van, az anyatej-helyettesítő tápszert a gyermekorvos utasítása szerint és ellenőrzése mellett ajánlott alkalmazni. A tápszer parenterálisan nem alkalmazható.  
Promóciós kód: G1706121 | Lezárás dátuma: 2017. augusztus 16.